

## Hälsodeklaration och ordination inför vaccination covid-19

Förnamn	Efternamn
Personnummer	

Vänligen svara på samtliga frågor och ta med formuläret vid vaccinationstillfället. Är du osäker på någon fråga så kan du prata med personalen på plats.

1. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukhusvård?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Har du ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller medicin?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Är du gravid?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Har du vaccinerat dig någon gång under de senaste 7 dagarna?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

### Instruktion till dig som vaccinerar gällande fråga 1-5

- Om personen svarat JA på fråga 1 och/eller 2: rådgör med en läkare.
- Om personen svarat JA på fråga 3: OBS Injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning.
- Om personen svarat JA på fråga 4: Alla gravida erbjuds vaccination mot covid-19. Vaccinen som används är mRNA vaccin (Comirnaty eller Spikevax [COVID-19 Vaccine Moderna]). Gravida under 35 år och utan riskfaktorer rekommenderas vaccination efter vecka 12. Gravida som är 35 år och äldre, samt gravida oavsett ålder som har ett BMI > 30 vid inskrivning i mödravården eller har en annan riskfaktor kan vid behov erbjudas vaccination före vecka 12, beroende på riskfaktor. **Riskfaktorer** Gravida som är över 35 år, har ett BMI > 30 vid inskrivning i mödravården och alla de som har om något av följande tillstånd eller sjukdomar: Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni ◦ Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. ~ Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. ~ Kronisk lever- eller njursvikt. ~ Diabetes typ 1 och typ 2. ~ Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
- Om personen svarat JA på fråga 5: Om personen är nyligen vaccinerad ska minst 7 dagar ha passerat sedan dess för att vaccination mot covid-19 ska kunna vara aktuell.

### Sjukvårdens anteckningar

Datum	Tid	Ordinator	Signatur
Vaccin	Dos	Batchnummer	

Administrationssätt:  intramuskulärt

Lokalisation:  vänster arm  höger arm

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande